

© А.Э. Менчер, Ю.С. Токарева  
Чита, Россия

## О дискретной арбитражной процедуре в четырех точках

© A. E. Mencher, Yu.S. Tokareva

### On a discrete arbitration procedure at four points

#### Введение

Рассматривается бескоалиционная игра с нулевой суммой, связанная с моделью дискретной арбитражной процедуры. В этой игре два участника: L и M, именуемые, соответственно, как работник и работодатель. Они ведут переговоры об установлении заработной платы. Игрок L делает предложение  $x$ , а игрок M – предложение  $y$ . Мы будем предполагать, что  $x$  и  $y$  – произвольные действительные числа.

Для достижения соглашения между игроками используется арбитражная схема, предложенная Фарбером [1]. Если  $x \leq y$ , то конфликта нет и игроки соглашаются на выплату жалованья, равного  $\frac{x+y}{2}$ . Если же,  $x > y$ , стороны апеллируют к арбитру A. Обозначим решение арбитра через  $\alpha$ . Тогда из предложений  $x$  и  $y$  выбирается то, которое ближе к точке  $\alpha$ . Предположим, что  $\alpha$  – дискретная случайная величина. Если  $\alpha = a$ , то, очевидно, что точкой равновесия является пара чистых стратегий  $(a;a)$ . Для  $\alpha$ , сосредоточенной в точках  $-1$  и  $1$ , решение установлено в [2], для  $\alpha$ , сосредоточенной в точках  $-1, 0, 1$ , решение установлено в [3].

Мы рассматриваем случай, когда  $\alpha$  принимает значения  $-2, -1, 1, 2$ .

#### 1. Постановка задачи

Предположим, что  $\alpha$  принимает значения  $-2, -1, 1, 2$  с равными вероятностями  $p = \frac{1}{4}$ . Рассматривается бескоалиционная игра, в которой стратегии игроков являются произвольными действительными числами:  $x, y \in R$ .

Функция выигрыша в игре имеет вид  $H(x, y) = EH_\alpha(x, y)$ , где

$$H_\alpha(x, y) = \begin{cases} \frac{x+y}{2}, & \text{если } x \leq y, \\ x, & \text{если } x > y, |x-\alpha| < |y-\alpha|, \\ y, & \text{если } x > y, |x-\alpha| > |y-\alpha|, \\ \alpha, & \text{если } x > y, |x-\alpha| = |y-\alpha|. \end{cases} \quad (1)$$

Мы будем искать равновесие в игре среди смешанных стратегий. Обозначим через  $f(x)$  и  $g(y)$  смешанные стратегии игроков  $L$  и  $M$ , соответственно. Предположим, что носитель распределения  $f(x)$  ( $g(y)$ ) лежит на положительной (отрицательной) полуоси, т.е.

$$x \in [0, +\infty), \quad f(x) \geq 0, \quad \int_0^{+\infty} f(x) dx = 1;$$

$$y \in (-\infty, 0], \quad g(y) \geq 0, \quad \int_{-\infty}^0 g(y) dy = 1.$$

Благодаря симметрии, отсюда следует, что цена игры равна нулю, а оптимальные стратегии должны быть симметричны относительно оси ординат:  $g(y) = f(-y)$ . Следовательно, достаточно построить оптимальную стратегию только для одного из игроков, например,  $L$ .

#### 2. Оптимальные стратегии

**Теорема.** Для игрока  $L$  оптимальной является стратегия

$$f(x) = \begin{cases} 0, & 0 \leq x < c, \\ \frac{\sqrt{c+1}}{\sqrt{(x+1)^3}}, & c < x < c+2, \\ \frac{\sqrt{c+3}}{\sqrt{(x-1)^3}}, & c+2 < x < c+4, \\ 0, & c+4 < x < +\infty, \end{cases} \quad (2)$$

где  $c = \sqrt{17} - 2$ .

38

**Доказательство.** Мы будем искать оптимальную стратегию игрока  $L$  в следующей форме:

$$f(x) = \begin{cases} 0, & 0 \leq x < c, \\ \varphi(x), & c < x < c+2, \\ \phi(x), & c+2 < x < c+4, \\ 0, & c+4 < x < +\infty, \end{cases} \quad (3)$$

где функции  $\varphi$  и  $\phi$  положительны и непрерывно дифференцируемы. Обозначим через  $H(f, y)$  функцию выигрыша игрока  $M$ . Эта функция непрерывна на всей полуоси  $(-\infty, 0]$ . Стратегия (3) будет оптимальной, если  $H(f, y) = 0$  для  $y \in [-(c+4), -c]$  и  $H(f, y) \geq 0$  для  $y \in (-\infty, -(c+4)) \cup (-c, 0]$ .

Пусть  $y \in [-(c+4), -(c+2)]$ , тогда

$$\begin{aligned} 4H(f, y) = & y + \int_{-2-y}^0 xf(x)dx + \\ & + \int_{-2-y}^{c+4} yf(x)dx + 2 \int_c^{c+4} xf(x)dx. \end{aligned} \quad (4)$$

Для оптимальности стратегии  $f(x)$  необходимо, чтобы  $H'(f, y) = H''(f, y) = 0$  на отрезке  $[-(c+4), -(c+2)]$ . Имеем,

$$\begin{aligned} 4H'(f, y) = & \\ = & 1 + 2(1+y)f(-2-y) + \int_{-2-y}^{c+4} f(x)dx, \end{aligned} \quad (5)$$

$$\begin{aligned} 4H''(f, y) = & 3f(-2-y) - \\ - & 2(1+y)f'(-2-y). \end{aligned} \quad (6)$$

В результате получаем дифференциальное уравнение

$$3f(-2-y) - 2(1+y)f'(-2-y) = 0.$$

Положим  $x = -2-y$ , тогда  $x \in [c, c+2]$ ,  $f(x) = \varphi(x)$  и

$$3\varphi(x) + 2(x+1)\varphi'(x) = 0. \quad (7)$$

Решение этого уравнения – функция

$$\varphi(x) = \frac{a}{\sqrt{(x+1)^3}}. \quad (8)$$

Аналогично, при  $y \in [-(c+2), -c]$ , находим

$$\begin{aligned} 4H(f, y) = & 2y + \int_c^{2-y} xf(x)dx + \\ & + \int_{2-y}^{c+4} yf(x)dx + \int_c^{c+4} xf(x)dx, \end{aligned} \quad (9)$$

$$4H'(f, y) = 2 +$$

$$+ 2(-1+y)f(2-y) + \int_{2-y}^{c+4} f(x)dx. \quad (10)$$

$$4H''(f, y) = 3f(2-y) - \\ - 2(-1+y)f'(2-y), \quad (11)$$

откуда получаем уравнение

$$3f(2-y) - 2(-1+y)f'(2-y) = 0.$$

Положим  $x = 2-y$ , тогда  $x \in [c+2, c+4]$ ,  $f(x) = \phi(x)$  и

$$3\phi(x) + 2(x-1)\phi'(x) = 0. \quad (12)$$

Решение этого уравнения – функция

$$\phi(x) = \frac{b}{\sqrt{(x-1)^3}}. \quad (13)$$

Определим константы  $a$  и  $b$ . Из (5) и (10), соответственно, получаем

$$0 = 4H'(f, -(c+2)-0) = 1 - \frac{2a(c+1)}{\sqrt{(c+1)^3}} +$$

$$+ \int_c^{c+4} f(x)dx = 2 - \frac{2a}{\sqrt{c+1}};$$

$$0 = 4H'(f, -(c+2)+0) = 2 - \frac{2b(c+3)}{\sqrt{(c+3)^3}} +$$

$$+ \int_{c+4}^{c+4} f(x)dx = 2 - \frac{2b}{\sqrt{c+3}}.$$

Таким образом,

$$a = \sqrt{c+1}, \quad b = \sqrt{c+3} \quad (14)$$

и функция  $f(x)$  принимает вид (2). Найдем константу  $c$ . Итак,

$$\begin{aligned} 1 = & \int_c^{c+4} f(x)dx = \int_c^{c+2} \frac{\sqrt{c+1}}{\sqrt{(x+1)^3}} dx + \\ & + \int_{c+2}^{c+4} \frac{\sqrt{c+3}}{\sqrt{(x-1)^3}} dx = 2 \left( \sqrt{\frac{c+3}{c+1}} - \sqrt{\frac{c+1}{c+3}} \right). \end{aligned}$$

Положим, как и в [2],  $\frac{\sqrt{c+1}}{\sqrt{c+3}} = z$ , тогда

получаем  $2z^2 + z - 2 = 0$ ,  $z = \frac{\sqrt{17}-1}{4}$  и, на конец,  $c = \sqrt{17} - 2$ .

Для дальнейшего найдем математическое ожидание стратегии  $f(x)$ . Имеем,

$$\int_c^{c+4} xf(x)dx =$$

$$= \int_c^{c+2} \frac{\sqrt{c+1} \cdot x}{\sqrt{(x+1)^3}} dx + \int_{c+2}^{c+4} \frac{\sqrt{c+3} \cdot x}{\sqrt{(x-1)^3}} dx =$$

$$\begin{aligned}
 &= \int_c^{c+2} \frac{\sqrt{c+1}}{\sqrt{x+1}} dx - \int_c^{c+2} \frac{\sqrt{c+1}}{\sqrt{(x+1)^3}} dx + \\
 &+ \int_{c+2}^{c+4} \frac{\sqrt{c+3}}{\sqrt{x-1}} dx + \int_{c+2}^{c+4} \frac{\sqrt{c+3}}{\sqrt{(x-1)^3}} dx = \\
 &= \frac{2(2c+4)}{\sqrt{c+1} \cdot \sqrt{c+3}} = c+2. \quad (15)
 \end{aligned}$$

Теперь займемся проверкой выполнения условий оптимальности для стратегии  $f(x)$ .

Пусть  $y \in [-(c+4), -(c+2)]$ , тогда из (4) и (15) получаем

$$\begin{aligned}
 4H(f, y) &= y + \int_c^{-2-y} \frac{\sqrt{c+1} \cdot x}{\sqrt{(x+1)^3}} dx + \\
 &+ \int_{-2-y}^{c+2} \frac{\sqrt{c+1} \cdot y}{\sqrt{(x+1)^3}} dx + \int_{c+2}^{c+4} \frac{\sqrt{c+3} \cdot y}{\sqrt{(x-1)^3}} dx + 2(c+2) = \\
 &= \frac{2\sqrt{c+1}}{\sqrt{-1-y}} (-1-y+1+y) + \\
 &+ 2y \left( \frac{\sqrt{c+3}}{\sqrt{c+1}} - \frac{\sqrt{c+1}}{\sqrt{c+3}} \right) - y = y - y = 0. \quad (16)
 \end{aligned}$$

Пусть  $y \in [-(c+2), -c]$ , тогда из (9) и (15) получаем

$$\begin{aligned}
 4H(f, y) &= 2y + \int_c^{c+2} \frac{\sqrt{c+1} \cdot x}{\sqrt{(x+1)^3}} dx + \\
 &+ \int_{c+2}^{-2-y} \frac{\sqrt{c+3} \cdot x}{\sqrt{(x-1)^3}} dx + \int_{-2-y}^{c+4} \frac{\sqrt{c+3} \cdot y}{\sqrt{(x-1)^3}} dx + (c+2) = \\
 &= 2 \frac{\sqrt{c+3}}{\sqrt{1-y}} (1-y-1+y) + \\
 &+ 2 \left( \frac{\sqrt{c+3}}{\sqrt{c+1}} + \frac{\sqrt{c+1}}{\sqrt{c+3}} \right) - (c+2) = \quad (17) \\
 &= (c+2) - (c+2) = 0.
 \end{aligned}$$

Таким образом,  $H(f, y) = 0$  на отрезке  $[-(c+4), -c]$ .

Далее, пусть  $y \in (-\infty, -(c+8)]$ , тогда

$$4H(f, y) = 4 \int_c^{c+4} xf(x) dx = 4(c+2), \text{ откуда}$$

$$H(f, y) = c+2 = \sqrt{17}. \quad (18)$$

Пусть  $y \in [-(c+8), -(c+6)]$ , тогда

$$\begin{aligned}
 4H(f, y) &= \int_c^{-4-y} xf(x) dx + \\
 &+ \int_{-4-y}^{c+4} yf(x) dx + 3 \int_c^{c+4} xf(x) dx, \quad (19)
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 4H'(f, y) &= (4+2y)f(-4-y) + \int_{-4-y}^{c+4} f(x) dx = \quad 39 \\
 &= \frac{2(2+y)\sqrt{c+3}}{\sqrt{(-5-y)^3}} + \\
 &+ \int_{-4-y}^{c+4} \frac{\sqrt{c+3}}{\sqrt{(x-1)^3}} dx = -2 - \frac{6\sqrt{c+3}}{\sqrt{(-5-y)^3}} < 0. \quad (20)
 \end{aligned}$$

Пусть  $y \in [-(c+6), -(c+4)]$ , тогда

$$\begin{aligned}
 4H(f, y) &= \int_c^{-4-y} xf(x) dx + \int_{-4-y}^{c+4} yf(x) dx + \\
 &+ \int_c^{-2-y} xf(x) dx + \int_{-2-y}^{c+4} yf(x) dx + \\
 &+ 2 \int_c^{c+4} xf(x) dx, \quad (21)
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 4H'(f, y) &= (4+2y)f(-4-y) + \\
 &+ \int_{-4-y}^{c+4} f(x) dx + (2+2y)f(-2-y) +
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 &+ \int_{-2-y}^{c+4} f(x) dx = \\
 &= \frac{(4+2y)\sqrt{c+1}}{\sqrt{(-3-y)^3}} + \int_{-4-y}^{c+2} \frac{\sqrt{c+1}}{\sqrt{(x+1)^3}} dx + \\
 &+ \int_{c+2}^{c+4} \frac{\sqrt{c+3}}{\sqrt{(x-1)^3}} dx + \frac{(2+2y)\sqrt{c+3}}{\sqrt{(-3-y)^3}} + \\
 &+ \int_{-2-y}^{c+4} \frac{\sqrt{c+3}}{\sqrt{(x-1)^3}} dx = \\
 &= -\frac{2(\sqrt{c+1} + 2\sqrt{c+3})}{\sqrt{(-3-y)^3}} - 3 < 0. \quad (22)
 \end{aligned}$$

Пусть  $y \in [-c, -(c-2)]$ , тогда

$$\begin{aligned}
 4H(f, y) &= 2y + \\
 &+ \int_c^{-2-y} xf(x) dx + \int_{-2-y}^{c+4} yf(x) dx, \quad (23)
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 &+ \int_c^{4-y} xf(x) dx + \int_{4-y}^{c+4} yf(x) dx,
 \end{aligned}$$

$$4H'(f, y) = 2 + (-2+2y)f(2-y) +$$

$$\begin{aligned}
 &+ \int_{2-y}^{c+4} f(x) dx + (-4+2y)f(4-y) +
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 &+ \int_{4-y}^{c+4} f(x) dx =
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 40 &= 2 + \frac{(-2+2y)\sqrt{c+1}}{\sqrt{(3-y)^3}} + \\
 &+ \int_{2-y}^{c+2} \frac{\sqrt{c+1}}{\sqrt{(x+1)^3}} dx + \int_{c+2}^{c+4} \frac{\sqrt{c+3}}{\sqrt{(x-1)^3}} dx + \\
 &+ \frac{(-4+2y)\sqrt{c+3}}{\sqrt{(3-y)^3}} + \int_{4-y}^{c+4} \frac{\sqrt{c+3}}{\sqrt{(x-1)^3}} dx = \\
 &= \frac{4\sqrt{c+1} + 2\sqrt{c+3}}{\sqrt{(3-y)^3}} - 1. \quad (24)
 \end{aligned}$$

Имеем

$$\begin{aligned}
 4H'(f, -c+0) &= \frac{4\sqrt{c+1} + 2\sqrt{c+3}}{\sqrt{(c+3)^3}} - 1 = \\
 &= \frac{(4\sqrt{c+1} + 2\sqrt{c+3})(\sqrt{c+1})}{\sqrt{c+3} \cdot \sqrt{c+1} \cdot (c+3)} - 1 = \\
 &= \frac{4c+4+8}{4(c+3)} - 1 = 0, \quad (25)
 \end{aligned}$$

$$4H''(f, y) = \frac{6\sqrt{c+1} + 3\sqrt{c+3}}{\sqrt{(3-y)^3}} > 0, \quad (26)$$

откуда

$$H'(f, y) > 0 \text{ в } (-c, -(c-2)]. \quad (27)$$

Пусть, наконец,  $y \in [-(c-2), 0]$ , тогда

$$\begin{aligned}
 4H(f, y) &\approx 3y + \\
 &+ \int_c^{4-y} xf(x)dx + \int_{4-y}^{c+4} yf(x)dx, \quad (28)
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 4H'(f, y) &\approx 3 + (-4+2y)f(4-y) + \\
 &+ \int_{4-y}^{c+4} f(x)dx = \\
 &= 3 + \frac{(-4+2y)\sqrt{c+3}}{\sqrt{(3-y)^3}} + \int_{4-y}^{c+4} \frac{\sqrt{c+3}}{\sqrt{(x-1)^3}} dx = \\
 &= \frac{\sqrt{c+3}}{\sqrt{(3-y)^3}} + 1 > 0. \quad (29)
 \end{aligned}$$

Из формул (16), (17), (18), (20), (22), (25), (27) и (29) заключаем, что  $H(f, y) > 0$  для  $y \in (-\infty, -(c+4)) \cup (-c, 0]$ , что и завершает доказательство теоремы.

#### Литература

1. Farber H. An analysis of final-offer arbitration // Journal of conflict resolution. – V. 35. – 1990. – Pp. 683-705.
2. Mazalov V.V., Zabelin A.A., Karpin A.S. Equilibrium in arbitration game // Probabilistic Methods in Discrete Mathematics. – 2002. – Pp. 41-46.
3. Mazalov V.V., Menthcher A.E., Tokareva J.S. On a discrete arbitration procedure in three points // Game Theory and Applications 11, Nova Science Publishers. – N.Y., 2005. – Pp. 87-91.